

de même couleur allant de la base de la dorsale à la nuque ; opercule cœrulescent, piqueté de noirâtre ; nageoires grisâtres. Longueur 0^m070.

Individus jeunes de 0^m045 de long. Coloration comme chez l'adulte. Hauteur du corps contenue quatre fois et demie, longueur de la tête trois fois et deux tiers dans la longueur totale. Diamètre de l'œil un peu plus grand que la longueur du museau, compris trois fois et demie dans la longueur de la tête.

Individus très-jeunes de 0^m020 de long. Coloration d'un vert olive uniforme. Hauteur du corps comprise cinq fois, longueur de la tête quatre fois dans la longueur totale.

ÉPIRE.

M. Letourneux n'a recueilli qu'une seule espèce en Épire (Albanie méridionale), dans la rivière Nicopolis, près de Prévéjà.

Leuciscus (Leucos) aulus, Bon. sp.— Cette espèce, d'après M. Günther, représente le *Leuciscus rutilus* dans le sud de l'Europe ; cet auteur la cite dans le lac de Garde, la rivière Rieka (Montenegro) et la rivière Marenta (Dalmatie). Heckel et Kner la citent à Maseniz, en Dalmatie, et à Trévisé (Vénétie). Le *Leucos rubella*, variété du *Leucos aulus*, a été recueilli à Brisclegg, dans le Tyrol, dans le lac de Garde, en Istrie et en Dalmatie ; le *Leucos basak*, autre variété de la même espèce, est du lac de Drusino, en Dalmatie. Cuvier et Valenciennes mentionnent l'espèce dans le Piémont et dans le lac Majeur ; elle est d'ailleurs représentée dans ses deux localités par une variété qui a été désignée sous le nom de *Leuciscus altus*.

*Description de quelques Blennioïdes de la collection
du Muséum d'histoire naturelle,
par M. H.-E. Sauvage.*

1. *Blennius nigrescens*. n. sp.

D. XII, 18 ; A. 22.

Hauteur du corps contenue quatre fois deux tiers, lon-

gueur de la tête quatre fois dans la longueur totale. Museau obtus; pas de dents canines; espace interoculaire étroit et concave; tentacules orbitaires longs, palmés, plus hauts que le diamètre de l'œil; pas d'autres filaments sur la tête. Dorsale non continue avec la caudale, un peu échancrée, les deux portions ayant presque même hauteur. Brun noirâtre uniforme. Longueur 0^m090.

Expédition de la Vénus : Dupetit-Thouars.

2. *Blennius goreensis*, C. V. (1).

D. XI, 18; A. 22.

Hauteur du corps comprise six fois, longueur de la tête un peu plus de quatre fois dans la longueur totale. Museau obtus; une dent recourbée et de petite taille à la mandibule; espace interorbitaire très-étroit; tentacules orbitaires plus longs que le diamètre de l'œil, au nombre de deux à chaque orbite, l'antérieur effilé et plus long que le postérieur. Dorsale commençant au-dessus du bord du préopercule; dorsale molle non réunie à la caudale; anale moins haute que la dorsale postérieure; pectorales arrivant à l'anus. Gris foncé tirant sur le violet; nageoires de couleur foncée. Longueur 0^m080.

Gorée : Rang.

3. *Petrascites lineo-punctatus*, Guichenot *in coll.*

D. 34; A. 25.

Hauteur du corps contenue sept fois, longueur de la tête sept fois dans la longueur totale. Museau tronqué antérieurement, plus long que le diamètre de l'œil; canine de la mandibule bien plus forte que celle de la mâchoire supérieure; pas de tentacules sur la tête; espace interorbitaire bombé, aussi large que le diamètre de l'œil. Caudale échancrée. Corps d'un jaune-brunâtre semé de

(1) *Hist. des poissons*, t. IX, p. 255.

nombreux petits points noirs; trois bandes noires verticales sur la tête, et trois bandes de même couleur sur la partie antérieure du tronc, ces bandes se prolongeant sur le dos; une tache noire sur le pédicule caudal; extrémité des rayons de la dorsale et de l'anale noirâtre. Longueur 0^m080.

Japon : A. Éloffe.

4. *Salarias doliatus*, n. sp.

D. XII, 22; A. 25.

Dorsale échancrée, arrivant à la base de la caudale. Une crête sur la tête; une paire de tentacules orbitaires aussi hauts que le diamètre de l'œil; profil antérieur de la tête bombé; pas de canines. Hauteur du corps contenue six fois et demie, longueur de la tête cinq fois dans la longueur totale. Brunâtre avec une dizaine de larges bandes verticales de couleur plus foncée; une tache noire à la base de la caudale; quelques traits brunâtres aux nageoires verticales. Longueur 0^m050.

Océan atlantique : Quoy et Gaimard.

5. *Salarias brasiliensis*, n. sp.

D. X, 22; A. 20.

Dorsale non échancrée. Pas de crête sur la tête. Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, contenue cinq fois dans la longueur totale. Profil antérieur de la tête vertical; une paire de tentacules courts et frangés à la nuque, au-dessus de l'orbite et à la narine; pas de canines. Dorsale continue avec la caudale. Brunâtre avec des taches jaunes irrégulières et six ou sept bandes verticales de couleur noire; des taches jaunes entourant la partie postérieure de l'orbite; des taches de même couleur au bord du préopercule et de l'interopercule; quelques taches jaunâtres devant la pectorale, qui porte des points noirs sur les rayons; trois lignes noires aux ventrales; dorsales mouchetées de noir; deux bandes noires

peu accentuées à l'anale; des points noirs à la caudale. Longueur 0^m075.

Sainte-Catherine du Brésil : Vignes.

6. *Salarias Harmandi*, n. sp.

D. XII, 22; A. 19.

Dorsale non échancrée, arrivant à la base de la caudale. Pas de crête sur la tête. Hauteur du corps contenue sept fois et demie, longueur de la tête six fois dans la longueur totale. Profil antérieur de la tête presque vertical; une paire de tentacules aussi longs que le diamètre de l'œil et filiformes au-dessus de l'orbite; une faible canine à la mâchoire inférieure seulement. Rayons antérieurs de l'anale allongés, bien plus hauts que le corps. Gris brunâtre, la moitié antérieure du corps portant de nombreux petits points noirs, la moitié postérieure ornée de lignes verticales noires formant huit bandes accouplées deux à deux; une bande noire allant de l'œil à la gorge; quelques taches blanches derrière l'œil, sur les joues et à la gorge; de grosses taches jaunâtres à la base de la dorsale antérieure; des taches plus petites à la dorsale molle et à la base de l'anale; de petites taches brunes aux dorsales; extrémité des rayons de l'anale noirâtres; des taches de même couleur à la caudale. Longueur 0^m065.

Poulo-Condor : Harmand.

Voisine du *Salarias nitidus*, Gthr. des mers de Chine, cette espèce en diffère par la formule de l'anale, les proportions du corps et quelques détails dans la coloration.

7. *Salarias cervus*, C. V. in coll.

D. XII, 14; A. 17.

Dorsale non échancrée, non réunie à la caudale. Pas de crête sur la tête. Hauteur du corps contenue six fois, longueur de la tête quatre fois et demie dans la longueur totale. Pas de canine; tentacule orbitaire court et grêle. Corps jaune-grisâtre avec des bandes verticales; des

taches jaunâtres dans la partie antérieure du tronc; tête nuancée de jaunâtre et de brun, piquetée de noir. Longueur 0^m055.

Mer Rouge : Ehrenberg.

8. *Salarias Montanoi*, n. sp.

D. 23; A. 24.

Dorsale faiblement échancrée, ne se continuant pas avec la caudale. Pas de canine; une crête très-développée sur la tête; un seul tentacule bifide et court à la partie postérieure de l'orbite. Hauteur du corps contenue sept fois et demie, longueur de la tête six fois dans la longueur totale. Caudale arrondie; ventrales arrivant à l'anale. Violacé; de nombreuses et étroites lignes noires verticales sur le corps, qui porte, vers la partie antérieure, quelques petits points noirs; de petits points noirs disposés en lignes sur la crête occipitale et à la partie supérieure de la tête; deux étroites lignes noires allant de l'œil au museau; anale, dorsale et caudale d'un violet clair, plus foncées à l'extrémité. Longueur 0^m070.

Province d'Albay (Luçon) : Montano et Rey.

9. *Salarias Reyi*, n. sp.

D. 33; A. 25.

Dorsale non échancrée, non continue avec la caudale, seconde épine dorsale prolongée en filament. Pas de canines; pas de crête occipitale; un seul tentacule très-court à la partie postérieure de l'orbite. Hauteur du corps près de neuf fois, longueur de la tête sept fois dans la longueur totale. Caudale faisant le quart de la longueur du corps; premiers rayons de l'anale plus courts que les suivants; pectorales arrivant jusqu'à l'anus. Violacé; avec des taches nuageuses de couleur plus foncée et d'autres de couleur plus claire; une ligne argentée bordant l'œil; une ligne noirâtre dans la partie antérieure de l'anale. Longueur 0^m070.

Luçon : Montano et Rey.

10. *Clinus marmoratus*, Castelnau (1).

D. XXXVIII, 3; A. II, 24; V. 3.

Hauteur du corps comprise cinq fois, longueur de la tête quatre fois et demie dans la longueur totale. Museau un peu plus court que le diamètre de l'œil; espace interorbitaire concave et étroit; tentacule orbitaire court; pas de dents palatines. Écailles assez grandes. Les trois premières épines dorsales un peu détachées des suivantes; dorsale postérieure unie avec la caudale, à peine plus haute que la dorsale épineuse. Brunâtre avec sept bandes verticales composées de petits points noirs s'étendant sur les nageoires verticales; des points noirs sur les rayons de la caudale; des lignes transversales noires aux pectorales: des taches et des lignes noires sur la tête. Longueur 0^m100.

Cap : de Castelnau.

Cette espèce paraît présenter des variations dans la coloration; elle est, en effet, ainsi décrite par Castelnau : « Cette espèce est établie sur de petits *Clinus*, dont la première dorsale est à peine plus élevée que la seconde. Un individu était d'un rose lie de vin, avec des bandes transversales brunes, qui ne s'étendent pas sur le ventre; d'autres étaient verts, mais marbrés. »

*Description de quelques poissons de la collection
du Muséum d'histoire naturelle,*

par M. H.-E. Sauvage (2).

Genre *Pseudopristipoma*, n. gen.

Forme du corps élevée, comprimée. Bouche fendue ho-

(1) *Mémoire sur les poissons de l'Afrique australe*, p. 52. Paris, in-8°, 1861.

(2) Cf. *Bull. Soc. Phil.*, séance du 12 juillet 1879.